试卷代号:11474　　座位号□□

国家开放大学2026年春季学期期末统一考试

临床医学概论(本)　试题

2026年7月

注意事项:

1. 将你的准考证号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共50分)

1. 流行性出血热的常见表现是(　　)。
   A. 发热伴寒战　　B. 发热伴口角疱疹
   C. 发热伴肝脾肿大　　D. 发热伴结膜出血
   E. 发热伴昏迷
2. 按口腔温度,属于中热的是(　　)。
   A. 41℃　　B. 36.3℃～37.2℃
   C. 37.3℃～38℃　　D. 38.1℃～39℃
   E. 39.1℃～41℃
3. 头痛伴发热常见于(　　)。
   A. 青光眼　　B. 偏头痛
   C. 感染性疾病　　D. 脑血管畸形
   E. 三叉神经痛
4. 头痛常见的病因不包括(　　)。
   A. 脑炎　　B. 高血压
   C. 颈椎病　　D. 流感
   E. 慢性胃炎

5. 在病理情况下,粪隐血可见于(　　)。
   A. 脂肪或酪蛋白食物消化不良　　B. 消化道溃疡
   C. 痛风　　D. 胰腺炎
   E. 骨折
6. 出现糖尿病酮尿提示(　　)。
   A. 活动性肢端肥大症　　B. 甲状腺功能亢进
   C. 胰岛素分泌过度　　D. 伤寒、麻疹、猩红热
   E. 糖尿病尚未控制
7. 过敏性疾病可引起(　　)。
   A. 中性粒细胞升高　　B. 嗜酸性粒细胞升高
   C. 红细胞升高　　D. 单核细胞升高
   E. 淋巴细胞升高
8. 尿酮体增高最多见于(　　)。
   A. 伤寒　　B. 甲状腺功能亢进
   C. 贫血　　D. 糖尿病
   E. 肝硬化
9. 表现为痰多、可带血或呈脓血痰的肺炎是(　　)。
   A. 肺炎链球菌肺炎　　B. 葡萄球菌肺炎
   C. 支原体肺炎　　D. 衣原体肺炎
   E. 病毒性肺炎
10. 支原体肺炎的临床表现特点为(　　)。
    A. 发病前常有受凉等诱因
    B. 发病急
    C. 高热,体温多高达39℃～40℃
    D. 肺实变体征明显
    E. 起病缓慢,咳嗽多为阵发刺激性呛咳,咳少量黏液
11. 抢救心跳呼吸骤停的患者时,适合使用电击除颤的情况是(　　)。
    A. 心室颤动　　B. 心室静止
    C. 心电一机械分离　　D. 心肌梗死
    E. 休克
12. 心跳骤停的诊断要点不包括(　　)。
    A. 意识丧失　　B. 颈动脉搏动消失
    C. 呼吸断续或停止　　D. 心电图显示室性心动过速
    E. 血压测不出

○—○—○

考点名称:_____

姓名:_____

准考证号:_____

○—○—○

13. 胃食管反流病的特征性表现是(　　)。

A. 胸痛　　B. 咽喉炎

C. 胸骨后烧灼感　　D. 慢性咳嗽

E. 咽部异物感

14. 我国肝硬化最常见的原因是(　　)。

A. 乙型病毒性肝炎　　B. 酒精中毒

C. 药物中毒　　D. 胆汁淤积

E. 循环障碍

15. 引起尿路感染的易感因素是(　　)。

A. 尿路梗阻　　B. 淋巴道感染

C. 上行感染　　D. 血行感染

E. 直接感染

16. 下列尿路感染用药原则中错误的是(　　)。

A. 对不同类型的尿路感染给予不同治疗时间

B. 选用副作用少的抗生素

C. 无病原学结果前,首选对革兰阳性杆菌有效的抗生素

D. 选用致病菌敏感的抗生素

E. 选用肾毒性小的抗生素

17. 少尿是指(　　)。

A. 尿量＜100mL/24h　　B. 尿量＜1000mL/24h

C. 尿量＜1400mL/24h　　D. 尿量＜400mL/24h

E. 尿量＜800mL/24h

18. 再生障碍性贫血最主要的诊断依据是(　　)。

A. 感染、出血、贫血　　B. 网织红细胞计数减低

C. 无肝脾肿大　　D. 全血红胞减少

E. 骨髓增生低下

19. 溶血性贫血的原因不包括(　　)。

A. 遗传性球形细胞增多症　　B. 血型不合

C. 肝炎病毒　　D. 丙酮酸激酶缺乏

E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

20. 关于急性白血病临床表现的描述,不正确的是(　　)。

A. 发热　　B. 贫血

C. 出血　　D. 多数患者白细胞减少

E. 淋巴结和肝、脾大

21. 霍奇金淋巴瘤典型的特征是(　　)。

A. 无痛性淋巴结肿大　　B. 进行性淋巴结肿大

C. 镜下见 R-S 细胞　　D. 发热

E. 消瘦

22. 糖尿病慢性并发症不包括(　　)。

A. 糖尿病酮症酸中毒　　B. 糖尿病肾病

C. 糖尿病视网膜病　　D. 糖尿病心肌病

E. 动脉粥样硬化

23. 肥胖的 2 型糖尿病患者的首选药物是(　　)。

A. 胰岛素　　B. 格列本脲

C. 二甲双胍　　D. 阿卡波糖

E. 瑞格列奈

24. 主要通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的药物是(　　)。

A. 双胍类药物　　B. 磺脲类药物

C. α-糖苷酶抑制剂　　D. 胰岛素增敏药

E. DPP-4 抑制剂

25. 最常见的出血性脑血管疾病是(　　)。

A. 短暂性脑血管病　　B. 脑血栓形成

C. 脑栓塞　　D. 脑出血

E. 脑梗死

二、名词解释(每题 5 分,共 20 分)

26. 呼吸困难

27. 心力衰竭

28. 慢性肾功能衰竭

29. 缺铁性贫血

三、简答题(每题 10 分,共 30 分)

30. 简述我国制定的重症肺炎的判断标准。

31. 简述左心衰竭的主要临床表现。

32. 简述急性胰腺炎的内科治疗原则。

试卷代号：11474

国家开放大学2026年春季学期期末统一考试

临床医学概论(本)　试题答案及评分标准

（供参考）

2026年7月

一、单项选择题(每题2分，共50分)

1. D	2. D	3. C	4. E	5. B
6. E	7. B	8. D	9. B	10. E
11. A	12. D	13. C	14. A	15. A
16. C	17. D	18. E	19. C	20. D
21. C	22. A	23. C	24. B	25. D

二、名词解释(每题5分，共20分)

26. 呼吸困难：是指在主观上患者感到空气不足、呼吸费力，客观上表现为呼吸运动用力，严重时可出现张口呼吸、鼻翼扇动、端坐呼吸，甚至发绀、呼吸辅助肌参与呼吸运动，并可有呼吸频率、深度、节律的改变。

27. 心力衰竭：是指心脏疾病发展至一定阶段，心功能失代偿，使心输出量减少，全心衰竭时导致体循环灌注不足而肺循环淤血的一系列临床综合征。

28. 慢性肾功能衰竭：是指慢性肾脏病引起的肾小球滤过率下降及与此相关的代谢紊乱和临床症状组成的综合征。

29. 缺铁性贫血：由于体内储备的铁耗竭，血红蛋白合成减少而形成的贫血称为缺铁性贫血。以小细胞低色素性贫血伴相关的缺铁异常为典型表现。

三、简答题(每题10分，共30分)

30. 简述我国制定的重症肺炎的判断标准。

(1)意识障碍；

(2)呼吸频率＞30次/min；

(3)PaO_2(血氧分压)＜60mmHg、PaO_2/FiO_2(吸入气中的氧浓度)＜300，需行机械通气治疗；

(4)血压＜90/60mmHg；

(5)胸片显示双侧或多肺叶受累，或入院48h内病变扩大≥50%；

(6)少尿：尿量＜20mL/h，或＜80mL/4h，或急性肾功能衰竭需要透析治疗。

(1—4每项2分，5—6每项1分)

31. 简述左心衰竭的主要临床表现。

心输出量减少会导致外周循环灌注不足和肺循环淤血。(2分)

外周循环灌注不足表现为面色苍白、皮肤湿冷、冷汗淋漓，头晕乏力、烦躁不安或精神萎靡，心悸、少尿等。(4分)

肺循环淤血表现为劳力性呼吸困难、心源性哮喘、端坐呼吸、急性肺水肿等。当肺毛细血管楔压＞30mmHg时，血浆、红细胞外渗至肺泡内，引起粉红色泡沫血痰甚至咳血，严重时两肺布满湿啰音。(4分)

32. 简述急性胰腺炎的内科治疗原则。

(1)监测：在有条件的情况下应将重症者转入ICU，针对器官功能衰竭采取相应的措施。(1分)

(2)补液：应积极补充体液和电解质。长期禁食的患者需要注意补充维生素制剂。(1分)

(3)吸氧和镇痛：应保持动脉氧饱和度＞95%。对于严重腹痛者，临床常用哌替啶止痛。胃肠减压可在一定程度上减轻腹胀。(1分)

(4)预防和抗感染：胰腺感染后，应选择针对革兰阴性菌和厌氧菌的且对胰腺有较好渗透性的抗生素。(1分)

(5)减少胰液分泌。①禁食水：可降低胰液分泌量，减轻自身消化。(2分)②抑制胃酸：适当抑制胃酸可减少胰液量，缓解胰管内高压。(2分)③生长抑素及其类似物：天然生长抑素可抑制胰泌素和缩胆囊素刺激的胰液基础分泌。急性胰腺炎时，可予外源性补充生长抑素或生长抑素类似物奥曲肽持续静脉滴注。(1分)

(6)营养支持。对于轻症急性胰腺炎患者，在短期禁食期间可通过静脉补液对其提供能量。对于重症急性胰腺炎患者，在其肠蠕动尚未恢复前，应先予肠外营养，采用全营养混合液方式输入。(1分)